



CONSEILS VITICOLES DU 8 AVRIL 2009

stades phénologiques

Chardonnay : stade 03 «bourgeon dans le coton»

Pinot noir : stade 02 «gonflement du bourgeon» à 03 «bourgeon dans le coton»

Meunier : stade 01 «bourgeon d'hiver» à 02 «gonflement du bourgeon».

mange-bourgeons

En dehors des secteurs tardifs de meunier, les parcelles sont maintenant dans la phase de grande sensibilité aux mange-bourgeons. La situation est globalement calme

L'activité des chenilles reste à ce jour limitée et est, essentiellement, attribuée aux chenilles de boarmie. Les premiers dégâts de noctuelles ont été observés lors des tournées du début de semaine..

Dans les parcelles touchées, le proportion de ceps présentant au moins 1 bourgeon mangé dépasse rarement 1 à 2 % des ceps. Toutefois, ponctuellement dans les régions habituellement plus concernées par ces ravageurs (Côte des Blancs, Grande Vallée de la Marne, région d'Épernay), quelques parcelles présentent un niveau de dégâts plus important s'approchant, ou dépassant, le seuil d'intervention de 15 % de ceps touchés La parcelle la plus touchée est sur le secteur de Cumières et présente 21 % de ceps avec au moins un bourgeon mangé. La majorité des parcelles suivies sont indemnes

Conseil

Poursuivez la surveillance des parcelles sensibles Par principe, n'intervenez pas sans comptage préalable

Confusion sexuelle

Les diffuseurs doivent être installés quelques jours avant le début du vol de la première génération. A titre indicatif, la date moyenne des premières captures sur les 10 dernières années est le 18 avril pour la cochyliis et le 22 avril pour l'eudémis.

La période de pose recommandée se situe entre le 13 et le 24 avril. En 2009, le total des surfaces protégées par confusion sexuelle est estimé à environ 7300 ha soit près de 300 ha de plus qu'en 2008