



CONSEILS VITICOLES DU 29 AVRIL 2009

Stades phénologiques

Chardonnay : stade 09, proche du stade 12 « 5 à 6 feuilles étalées – inflorescences visibles »

Pinot noir : stade 09 « 2 à 3 feuilles étalées »

Meunier : stade 07 « 1 feuille étalée »

Mildiou

La maturité des oeufs n'est toujours pas acquise à ce jour. Il faut, en effet, encore un peu moins de 2 jours en conditions contrôlées pour germer.

Conseils

Attendre

Brenner

Les premières ascospores ont été vues au laboratoire.

Conseils

La couverture Brenner peut donc attendre le début de protection anti-mildiou.

Oïdium

La protection peut être anticipée au stade 15 « 7 à 8 feuilles étalées ». Une intervention positionnée plus précocement n'apportera aucun gain d'efficacité justifiant sa mise en oeuvre.

Conseils

L'association d'un anti-oïdium au premier traitement anti-mildiou ne doit pas être automatique.

Pyrales

La remontée des chenilles de pyrales se poursuit. Dans la majorité des parcelles, les populations sont loin du seuil d'intervention de 80 % des ceps occupés par au moins 1 pyrale.

Conseils

Les traitements doivent être limités aux seules parcelles dépassant le seuil des 80 % des ceps avec pyrales.

Attendre que les chenilles aient atteint une taille moyenne comprise entre 5 et 10 mm et d'employer un RCI (Régulateur de Croissance des Insectes) moins toxique pour les typhlodromes. Une autre stratégie est d'intervenir sur des chenilles mesurant en moyenne 4 à 5 mm avec un insecticide neurotoxique classique homologué sur Pyrale.

Tordeuses

Le vol se poursuit.

Conseils : Attendre

Sources : Avertissements viticoles C.I.V.C – Magister – DRAAF - SRAL