



CONSEILS VITICOLES DU 8 JUILLET 2009

Stades phénologiques

Chardonnay : stade 31 « Baies à taille de pois ». à début du stade 33 « Fermeture de la grappe »

Pinot noir : stade 31 « Baies à taille de pois ». à début du stade 33 « Fermeture de la grappe »

Meunier : stade 29 « Baies de la taille de grains de plomb » à stade 31

Mildiou

La situation continue à évoluer sur le feuillage, (résultats des contaminations de fin juin). Sur grappe, on note également une évolution avec l'apparition des symptômes liés aux pluies des 14 et 15 juin. Les parcelles concernées restent principalement celles présentant un état sanitaire déjà dégradé avant ces pluies. Les dégâts parfois plus spectaculaires sur grappes que sur feuilles s'expliquent par des contaminations début juin pendant la phase de très grande sensibilité des grappes. A noter, des symptômes de rot brun sont observés en ce début de semaine.

Dans les secteurs épargnés par le mildiou, l'état sanitaire sur grappes reste, bien maîtrisé. Les contaminations du 2 juillet ne devraient s'extérioriser, sur grappes, qu'à partir de la semaine du 20 au 24 juillet. Il n'est pas possible d'agir en curatif sur ces contaminations en cours d'incubation. Pour rappel, en tendance, le décalage entre l'apparition des symptômes sur feuilles et sur grappes est d'environ 1 semaine en début de saison et plutôt de 10-15 jours en fin de saison.

Conseil : La gestion des renouvellements est à gérer en fonction de l'état sanitaire des parcelles et des conditions météorologiques :

- dans les parcelles saines ou peu touchées : renouveler la protection à cadence normale en fonction du produit utilisé précédemment,
- - en situation de mildiou déclaré avec plusieurs taches par cep (feuillage principal) et/ou des symptômes fréquents sur inflorescences, maintenir des cadences de renouvellement à 10 jours maximum. Dans les deux cas, anticiper le renouvellement d'1 ou 2 jours en cas d'annonce de pluies en fin de persistance d'action. Continuer à alterner les substances actives (CAA, zoxamide et cymoxanil). Réserver les spécialités commerciales à base de cuivre pour les derniers traitements.

Oïdium

Le vignoble reste globalement sain. Les symptômes sur grappes sont limités.. Sur les parcelles touchées, la poursuite de la protection après la fermeture de la grappe est à envisager si la fréquence de grappes touchées au stade « Fermeture de la grappe » est supérieure à 10 %.

Conseils : La couverture anti-oïdium s'arrête au stade 33 « Fermeture de la grappe ». En parcelles saines ou touchées à une fréquence inférieure à 10% des grappes, le dernier traitement positionné au stade 31 permet d'assurer une protection efficace jusqu'au stade de fin de sensibilité des grappes. Pour les parcelles justifiant la poursuite de la protection (fréquence de grappes touchées > 10 %), toutes les substances actives sont utilisables dans le respect des restrictions d'utilisation.

Botrytis

Le stade "B" « Fermeture de la grappe » est proche, voire atteint, dans les parcelles les plus hâtives. Pour les parcelles concernées par la lutte chimique, l'intervention est à planifier dans les prochains jours selon l'évolution du stade phénologique.

Conseil : Positionner le produit juste en début de fermeture de la grappe. Penser à respecter l'alternance pluriannuelle des familles chimiques concernées par des phénomènes de résistances spécifiques (anilino-pyrimidines, carboxamides et fenhexamid)

Brenner

En parcelles traitées, les symptômes ont peu évolué au cours des dernières semaines. Ils restent principalement localisés sur les étages foliaires 3 et 4. A présent, les stocks d'ascospores sont pratiquement épuisés, les prochaines précipitations ne devraient plus générer d'importantes contaminations. De plus, les grappes approchent du stade de fin de sensibilité (fermeture de la grappe).

Conseils : Dans les parcelles et secteurs concernés du Barrois, la protection spécifique contre le rougeot parasitaire peut être suspendue

Tordeuses

Après une régression en début de semaine probablement liée aux fortes chaleurs, le vol cochylis se poursuit. Pour l'eudémis, les captures relevées au cours de la semaine dernière confirme le début des vols. Aucun oeuf d'eudémis n'a été observé. En situation confuse, aucun oeuf n'a été vu pour le moment notamment sur les 3 secteurs en dépassement de seuil en G1.

Conseils Il est trop tard pour positionner un RCI. Au vu des observations d'oeufs au stade « tête noire » de ce lundi et des dynamiques de vol, les produits préventifs classiques ou ceux à base de Bacillus Thuringiensis ou de spinosad sont à positionner entre le 7 et le 13 juillet (période à adapter selon la précocité des secteurs). Intervenir rapidement en Région d'Épernay, Côte des Blancs, Sézannais et sur Montgueux