N° 11 - 11 juin 2014

Champagne-Ardenne

Bulletin de Santé du Végétal

Vigne

A RETENIR CETTE SEMAINE

MILDIOU : toujours peu de symptômes signalés. Période de grande sensibilité des grappes jusqu'à grains de pois .

OIDIUM : vignoble toujours quasi indemne .

TORDEUSES : peu d'évolution. Pression G1 faible à modérée .

BOTRYTIS : soigner les travaux en vert (relevage, palissage) qui participent à la prophylaxie.

NOTE NATIONALE "ABEILLES" : note consultable sur les sites de la DRAAF et Chambre d'agriculture Champagne-Ardenne.



STADES PHENOLOGIQUES

Floraison en cours

Les températures estivales de ces derniers jours ont été favorables à la floraison. Dans la majorité des parcelles, la floraison est enclenchée voire sur la fin pour le chardonnay. En ce début de semaine, le pinot noir est proche du stade 23 "pleine floraison" et le meunier suit de près. Dans les prochains jours, les températures devraient légèrement baisser tout en restant au-dessus des normales saisonnières (prévisions Météo France). La floraison devrait donc s'achever au cours de la semaine, en toutes situations.

L'avance de la phénologie est de l'ordre de 4-5 jours, tous cépages confondus, par rapport à la moyenne décennale. La date moyenne du stade 23 "floraison" sur ces 10 dernières années est le 13 juin.

Chardonnay : stade 23 "pleine floraison- 50 % des capuchons floraux tombés" à stade 25 "fin floraison - 80 % des capuchons floraux tombés".

Pinot noir : stade 23.

Meunier : stade 21 "début floraison – 25 % des capuchons floraux tombés" à stade 23.

REMARQUE : *Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées du 2 au 6 juin sur 178 parcelles de vigne. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle.*

MILDIOU

Situation

Le vignoble est toujours quasi indemne de mildiou.
Dans la majorité des situations, il s'agit de taches isolées concernant le plus fréquemment les secteurs les plus arrosés lors des épisodes pluvieux du 1er mai et ceux du début de la deuxième décade de mai. À ce jour, aucun symptôme n'est signalé dans les régions d'Épernay, de la rive gauche de la vallée de la Marne et du sud de la Côte des Blancs.

Des cycles de contaminations sont potentiellement en cours suite aux épisodes pluvio-orageux enregistrés entre les 8 et 11 juin. Les fortes chaleurs de ces derniers jours favorisent une incubation rapide. Des sorties de taches sont possibles à partir du 13 juin (cf. tableau reprenant les données des abaques d'incubation élaboré à partir des prévisions Météo France - Répondeur).

Événements pluvieux	Sortie des symptômes sur feuilles à partir du :
8 juin	13 juin
9 juin	14 juin
10 juin	15 juin
11 juin	16 juin

Analyse du risque

La floraison est en cours où se termine. La phase de sensibilité importante des inflorescences perdure jusqu'au stade "grains de pois".
La pression mildiou reste faible car très peu de symptômes sont présents au vignoble.

Le risque épidémique est globalement faible, notamment dans les régions/secteurs sans symptômes. Toutefois, le risque épidémique mildiou est un peu plus présent dans deux cas de figure : là où des taches ont été signalées, et dans les secteurs les plus arrosés depuis début mai (Sud du Sézannais, Vitryat, Montagne de Reims, Massif de St-Thierry et région ouest de Château-Thierry) du fait des cumuls d'eau importants.

Pour gérer au mieux le risque mildiou, tenir compte des prévisions météorologiques et du cumul des pluies. Surveiller la météo.

OIDIUM

Situation

Peu d'évolution de la situation. Au 6 juin, toujours aucun symptômes décelé sur le réseau SBT.

L'indicateur régional "feuilles" est donc toujours au plus bas, comme 2005 et 2007 à stade phénologique équivalent (cf. graphe). Aucun symptôme n'a encore été détecté sur le réseau Magister. Calculé à la floraison, soit à la fin de cette semaine, cet indicateur permettra de statuer sur le risque épidémique oïdium de la campagne 2014.

Analyse du risque

D'après les observations sur les réseaux, 2014 se profile comme étant une année à risque épidémique modéré.

La floraison est en cours ou tout juste achevée. Les inflorescences sont dans leur phase de grande sensibilité et ceci jusqu'à grenaille-grains de pois. Rester vigilant.

TORDEUSES

Situation

Le constat dressé dans le dernier bulletin reste d'actualité. Dans la grande majorité des situations, le pourcentage de glomérules avec chenilles est inférieur à 10 pour 100 inflorescences.

Sur le réseau SBT au 6 juin, 41 % des parcelles sont concernées par des glomérules, toutes stratégies de protection confondues. En zone hors confusion sexuelle (105 parcelles observées), 48 % des parcelles présentaient au moins 1 glomérule (2 à 102 % de glomérules). En zone sous confusion sexuelle (71 parcelles observées), des glomérules ont été observés sur seulement 19 % des parcelles (2 à 12 % de glomérules). A noter, un cas marginal de dépassement de seuil d'intervention G1 sur une parcelle d'Epernay. Sur les autres réseaux, aucun dépassement de seuil n'est signalé à ce jour.

Analyse du risque

Les chenilles sont désormais bien à l'abri dans les glomérules et de taille importante. Fin des surveillances tordeuses G1.
Comme énoncé la semaine dernière, la pression de la première génération est faible à localement modérée. Elle est comparable à celle de la campagne 2012 (42 % de parcelles concernées) et donc supérieure à celle connue sur le réseau SBT en 2013 (25 % des parcelles concernées).

Depuis ce lundi 9 juin, le réseau de pièges pour le suivi du vol de deuxième génération est opérationnel. Il ne devrait pas tarder à débuter. A suivre…

Photo : chenille de cochylis en haut, chenille d'eudémis en bas.

BOTRYTIS

La pourriture grise est une maladie dont l'épidémiologie est extrêmement complexe. Le risque s'apprécie à la parcelle. Les mesures prophylactiques (réduction de la vigueur, travaux en vert, palissage soigné, limitation des blessures sur baies…) permettent de la réduire et peuvent suffire dans les parcelles peu ou pas sensibles.

Pour plus de précisions se reporter à la note technique commune 2014 consultable sur les sites Internet de la DRAAF Champagne-Ardenne et de la Chambre régionale d'agriculture Champagne-Ardenne.

NOTE NATIONALE "ABEILLES"

Merci de vous reporter à la note nationale "Abeilles", notamment pour prendre connaissance des exigences réglementaires pour toute intervention insecticide ou acaricide pendant la période de floraison des plantes mellifères et de production d'exsudats.
Note consultable sur le site de la DRAAF Champagne-Ardenne et de la Chambe d'agriculture Champagne-Ardenne.

Bulletin de Santé du Végétal

Vigne

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet :

- de la Chambre d'agriculture de Champagne-Ardenne : http://www.champagrica.fr/2-BSV-Vigne-2014
- et de la DRAAF : http://www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/BSV-vignes-2014

Prochain bulletin mercredi 18 juin 2014

EDITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE CHAMPAGNE-ARDENNE SUR LA BASE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU VIGNE :

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - CIVC - Cohesis Vigne - COMPAS - Coopérative Champagne Coligny - Champagne Chassenay d'Arce - Coopérative Charles Collin - CSGV - CVC Nicolas Feuillatte - FCM Consultants - GDV Aube - GDV Marne - GEDV Aisne - Chambre d'agriculture de la Marne - Magister – Ets RITARD - SOUFFLET Vigne—STAHL - Union Auboise - Union Champagne - Viti-Concept.

Rédaction : le CIVC avec relecture des CVC Nicolas Feuillatte, Soufflet vigne et DRAAF-SRAL.

Animation du réseau Vigne : Pascale PIENNE - CIVC. Tél. : 03 26 51 34 46. Courriel : pascale.pienne@civc.fr

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courriel à v.bochu@champagrica.fr

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO 2018.