

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de  
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°13 – 30 juin 2026

## À RETENIR CETTE SEMAINE

### PHENOLOGIE



Le stade « grains de pois » est acquis au vignoble. Les baies grossissent et les grappes se ferment progressivement.

### MILDIU

Légère progression des symptômes sur feuilles. Vignoble globalement sain. Pression maîtrisée. Conditions météo défavorables à la maladie.

### OIDIUM

Situation stable. Pression moyenne à élevée.

### FLAVESCENCE DOREE

Prospections précoces du 3 au 24 juillet. Prospections obligatoires du 19 août au 25 septembre.

### TORDEUSES DE LA GRAPPE

Vol des papillons de 2ème génération en cours. Aucun œuf observé pour le moment.



Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.  
Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

<https://www.r4p-inra.fr/fr/rapports-techniques-sur-les-resistances-en-france/>

La note technique commune résistances est disponible ici :

<https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2026-note-technique-commune-vigne.pdf>



Vous pouvez consulter la liste des produits de biocontrôle sur <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>.

Le réseau compte **130 parcelles** observées cette semaine.



## 1. Données météo



Consultez régulièrement les prévisions Météofrance (<https://meteofrance.com/>) ou, pour les professionnels, le portail du Comité Champagne (<https://meteo.comitechampagne.fr/meteo/previsions>).

## 2. Stades phénologiques



Stade « grains de pois ».

La vague de températures extrêmement chaudes est terminée depuis dimanche. Elle a duré une dizaine de jours. Elle s'est conclue avec quelques orages localisés.

Les baies atteignent la taille de petits pois. Les grappes commencent à se fermer.

Chardonnay, Pinot noir, Meunier : stade « début de la fermeture de la grappe » (BBCH 77), stade « grains de pois » (BBCH75) en secteurs tardifs.

La végétation conserve une douzaine de jours d'avance par rapport à la moyenne décennale.




## 1. Situation

La situation reste bien maîtrisée au vignoble, malgré une légère progression de la proportion de parcelles avec des symptômes sur feuilles. 30 parcelles du réseau RSBT sont maintenant concernées par la présence de quelques taches de mildiou, soit un peu plus de 21 % du réseau.

Quelques épisodes orageux sont survenus au vignoble les 27 et 28 juin. Les cumuls de pluie vont de quelques millimètres à 40 mm. Les secteurs les plus arrosés sont le Barrois, et dans une moindre mesure, la région de Château Thierry, la région de Dormans, le sud de la côte des Blancs, les coteaux du petit Morin, et le massif de St Thierry. D'après les abaques, les sorties de taches correspondant à ces pluies sont attendues à la fin de cette semaine, et devraient se limiter aux jeunes feuilles (broues, entre-cœurs).

Une période sèche est maintenant annoncée, avec des températures chaudes.


Mildiou



## 2. Analyse de risque

La situation est bien maîtrisée.

La sensibilité des grappes est en train de décroître. Des contaminations sont toujours possibles jusqu'à la fermeture complète de la grappe, mais elles resteront le plus souvent limitées à quelques baies (rot brun).



### 3. Gestion alternative du risque

La maîtrise du risque mildiou passe par une bonne prévention des prochaines contaminations. Les éléments à prendre en compte pour gérer le risque sont les cumuls d'eau, les prévisions de pluie, et l'état sanitaire des parcelles.

Les mesures prophylactiques (réduction de la vigueur, travaux en vert, palissage soigné pour aérer la zone des grappes) permettent de limiter la pression du mildiou.

Des fiches sur les méthodes alternatives et la prophylaxie sont disponibles [Vigne | DRAAF Grand Est](#)

|                                                                                   |                               |                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|  | LES GROUPES MILDIOU / VIGNE / | STROBILURINES ET AUTRES | SONT EXPOSÉS À UN RISQUE DE RÉSISTANCE. |
|                                                                                   |                               | TRIAZOLOPYRIMIDINES     |                                         |
|                                                                                   |                               | CARBOXAMIDES (CAA)      |                                         |
|                                                                                   |                               | CYANOACETAMIDEOXIMES    |                                         |
|                                                                                   |                               | PHENYLAMIDES (PA)       |                                         |
|                                                                                   |                               | BENZAMIDES              |                                         |
|                                                                                   |                               | AZOLE SULFONAMIDES      |                                         |



## OIDIUM

### 1. Situation

Les observations sur grappes se poursuivent.

Peu de signalements ont été faits depuis le dernier bulletin. Fréquence et intensité restent généralement faibles. Dans les parcelles concernées, le mycélium se développe à la surface des baies déjà contaminées.


Sur le réseau RSBT, la situation n'a pas évolué : 5 parcelles sur 140 présentent actuellement des symptômes sur grappes, soit un peu plus de 3 % des parcelles du réseau concernées par de l'oïdium. La situation est identique sur les autres réseaux?

### 2. Analyse de risque

Les grappes ne sont plus sensibles à de nouvelles contaminations après le stade « grains de pois ».

Il est possible de stopper la protection dans les parcelles sans symptômes et sans historique ayant atteint le stade « début fermeture de la grappe ».

Restez vigilants dans les parcelles/secteurs à historique et dans les parcelles présentant déjà des symptômes jusqu'à fermeture complète de la grappe. L'oïdium peut continuer à se développer à la surface des baies déjà contaminées.



### 3. Gestion alternative du risque

Les mesures prophylactiques (réduction de la vigueur, travaux en vert, palissage soigné pour aérer la zone des grappes, effeuillage précoce sur une face côté soleil levant) permettent de limiter la pression de l'oïdium.

Des fiches sur les méthodes alternatives et la prophylaxie sont disponibles [Vigne | DRAAF Grand Est](#)



Il existe des produits de biocontrôle, dont certains peuvent avoir une efficacité partielle.



LE GROUPE OIDIUM / VIGNE / AZA-NAPHTHALENES (AZN) EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.



Les premiers symptômes de jaunisses sont visibles au vignoble depuis fin mai. En cas de suspicion, faites un signalement sur l'application VigiCA ou par mail à l'adresse [fd@champagne.fr](mailto:fd@champagne.fr), et dans tous les cas, marquez le cep et l'entrée de route avec de la rubalise.

Des prospections précoces vont se dérouler du 3 au 24 juillet, autour des foyers de 2025, afin de repérer au plus tôt les ceps symptomatiques. Il s'agit de prospections volontaires, qui ne remplacent pas les prospections obligatoires d'août-septembre.


Les périmètres des prospections obligatoires, que cela soit en Zones Délimitées (zones avec foyers de « flavescence dorée » identifiés) et hors Zones Délimitées, sont consultables sur l'extranet du Comité Champagne. Une photo en vue aérienne s'affiche par défaut, mais le parcellaire peut être sélectionné. Aussi, découvrez les zones qui vous concernent dès à présent !

[https://civcwebsig.agaricids.com/index.php/view/map?repository=prelevementsjaunissespublic&project=1\\_ab\\_prospections\\_obligatoires\\_2026](https://civcwebsig.agaricids.com/index.php/view/map?repository=prelevementsjaunissespublic&project=1_ab_prospections_obligatoires_2026)

La campagne de surveillance se déroulera du 19 août au 25 septembre avec une pause vendanges. Quelques dates sont d'ores et déjà fixées, la majorité le sera dernière quinzaine de juillet

Pour toute information, consultez la page « flavescence dorée » de l'extranet du Comité Champagne :

<https://extranet.comitechampagne.fr/vigne/flavescence>



## Vos contacts

### Secrétariat - Informations FD

Service Vigne

[fd@champagne.fr](mailto:fd@champagne.fr)

03 26 51 50 64

### Pascale Pienne

Service Ecosystème et Protection

[fd@champagne.fr](mailto:fd@champagne.fr)

03 26 51 50 64

### Clément Gaunel

Service Ecosystème et Protection

[fd@champagne.fr](mailto:fd@champagne.fr)

03 26 51 50 64

### Alexandra Bonomeili

Service Ecosystème et Protection

[fd@champagne.fr](mailto:fd@champagne.fr)

03 26 51 50 64



### 1 Situation

Le vol des papillons se poursuit. Aucun œuf n'a été observé pour le moment.

### 2 Analyse du risque

Aucun risque G2 pour le moment. Attente du repérage des premiers œufs.



Œuf de tordeuse.

### 3. Gestion alternative du risque

Aucune intervention à prévoir au vignoble.

Pour en savoir plus sur la confusion sexuelle :

<https://ecophytopic.fr/leviers/proteger/pratiquer-la-confusion-sexuelle>

Des fiches sur les méthodes alternatives et la prophylaxie sont disponibles :

[https://grandest.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user\\_upload/273\\_chambre\\_dagriculture\\_grand\\_est/S\\_adapter\\_aux\\_transitions/Ecophyto/Fiches\\_prophylaxie/Viticulture/Vers\\_de\\_la\\_grappe.pdf](https://grandest.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/273_chambre_dagriculture_grand_est/S_adapter_aux_transitions/Ecophyto/Fiches_prophylaxie/Viticulture/Vers_de_la_grappe.pdf)

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

**Observations :** Ceresia, Certico, Chambre d'Agriculture de la Marne, Champagne Chassenay d'Arce, Champagne Veuve Cliquot Ponsardin, Champagne Vranken Pommery, Comité Champagne, Compas, CSGV, Ets Ritard, GDV Aube, GDV Marne, GEDV Aisne, Novagrain, Stahl, Terroirs et Vignerons de Champagne, Union Aube Vignerons en Champagne, Union Champagne, Vinelyss, Viti-Concept.

**Rédaction et animation :** Comité Champagne.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est. Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

**Coordination et renseignements :** Joliane BRAILLARD - [joliane.brillard@grandest.chambagri.fr](mailto:joliane.brillard@grandest.chambagri.fr)





## NOTES NATIONALES BIODIVERSITÉ

Les notes Biodiversité sont produites dans le cadre du Bulletin Santé Végétal BSV 2.0. Elles sont publiées régulièrement et mettent en avant les pratiques agricoles concourant au maintien ou à l'amélioration de la biodiversité.

L'objectif de ces notes est de faciliter la communication sur ces sujets auprès des agriculteurs, des conseillers agricoles mais aussi plus largement à tout lecteur du BSV 2.0.

<https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/notes-nationales-biodiversite>

