

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de

la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°14 – 7 juillet 2026

## À RETENIR CETTE SEMAINE

### PHENOLOGIE

Le stade « fermeture de la grappe » est en cours d'acquisition au vignoble.

### MILDIU

Situation calme. Conditions météo très défavorables à la maladie. Suspendre la protection jusqu'à début véraison.

### OIDIUM

Légère progression des symptômes sur grappes. Fin de protection à adapter à la situation parcellaire (état sanitaire et historique).

### FLAVESCENCE DOREE

Prospections précoces en cours, jusqu'au 24 juillet. Prospections obligatoires du 19 août au 25 septembre.

### TORDEUSES DE LA GRAPPE

Une perforation observée au vignoble. Risque G2 potentiellement présent en secteurs non confusés. Conditions météo défavorables aux papillons.



Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.

Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

<https://www.r4p-inra.fr/fr/rapports-techniques-sur-les-resistances-en-france/>

La note technique commune résistances est disponible ici :

<https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2026-note-technique-commune-vigne.pdf>



Vous pouvez consulter la liste des produits de biocontrôle sur <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole>.

Le réseau compte **135 parcelles** observées cette semaine.



## 1. Données météo



Consultez régulièrement les prévisions Météofrance (<https://meteofrance.com/>) ou, pour les professionnels, le portail du Comité Champagne (<https://meteo.comitechampagne.fr/meteo/previsions>).

## 2. Stades phénologiques



Fermeture de la grappe

Des températures très élevées sont à nouveau d'actualité en ce début de semaine. Cette tendance va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine, et s'amplifier durant les prochains jours.

Le temps sec qui perdure commence à être préjudiciable pour les parcelles ayant des sols superficiels. Un stress hydrique marqué est visible, notamment dans le Barrois, depuis la semaine dernière (jaunissement et chute des feuilles). Aucune pluie n'est annoncée pour la semaine à venir.

Les grappes se ferment. On compte en moyenne 3 semaines entre le début de la fermeture de la grappe et le début de la véraison. Les toutes premières baies vérees ont été vues en fin de semaine dernière, et le stade « début véraison » pourrait être atteint la semaine du 20 juillet.

Chardonnay, Pinot noir, Meunier : stade « fermeture de la grappe » (BBCH 79).

La végétation conserve une douzaine de jours d'avance par rapport à la moyenne décennale.




## 1. Situation

La situation reste globalement saine au vignoble. 34 parcelles du réseau RSBT sont maintenant concernées par la présence de quelques taches de mildiou sur feuilles, soit un peu plus de 24 % du réseau. Les grappes sont très saines.

Hormis quelques gouttes tombées le 30 juin (quelques millimètres) de manière très localisée, aucune pluie n'est à signaler depuis le dernier bulletin, et la période sèche devrait se poursuivre au moins pour la semaine à venir, accompagnée de températures très chaudes. Ces conditions sont très défavorables au mildiou.

Mildiou



## 2. Analyse de risque

La situation est calme et bien maîtrisée.

En raison des conditions météo défavorables à la maladie, et du stade phénologique avancé, la protection anti-mildiou peut être suspendue. Une dernière prise en compte du risque mildiou pourra être envisagée fin fermeture-début véraison, si des conditions pluvieuses sont annoncées à cette période, ou si l'état sanitaire du feuillage est dégradé, pour accompagner au mieux la fin de saison et assurer un feuillage principal fonctionnel le plus longtemps possible pour une bonne mise en réserve.



### 3. Gestion alternative du risque

Surveillez la météo et notamment l'annonce d'orages. Faites un dernier point de l'état sanitaire des parcelles début véraison.

Les mesures prophylactiques (réduction de la vigueur, travaux en vert, palissage soigné pour aérer la zone des grappes) permettent de limiter la pression du mildiou.

Des fiches sur les méthodes alternatives et la prophylaxie sont disponibles [Vigne | DRAAF Grand Est](#)

|                                                                                   |                               |                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|  | STROBILURINES ET AUTRES       |                      |                                         |
|                                                                                   | LES GROUPES MILDIOU / VIGNE / | TRIAZOLOPYRIMIDINES  | SONT EXPOSÉS À UN RISQUE DE RÉSISTANCE. |
|                                                                                   |                               | CARBOXAMIDES (CAA)   |                                         |
|                                                                                   |                               | CYANOACETAMIDEOXIMES |                                         |
|                                                                                   |                               | PHENYLAMIDES (PA)    |                                         |
|                                                                                   |                               | BENZAMIDES           |                                         |
|                                                                                   |                               | AZOLE SULFONAMIDES   |                                         |



## OIDIUM

### 1. Situation

Les observations sur grappes se poursuivent. La situation a légèrement progressé depuis le dernier bulletin. Quelques nouvelles parcelles sont concernées, et le mycélium continue de se développer à la surface des baies déjà contaminées.

Sur le réseau RSBT, 11 parcelles sur 140 présentent maintenant des symptômes sur grappes, soit presque 8 % des parcelles du réseau concernées par de l'oïdium (contre 3 % la semaine dernière). Dans les parcelles touchées, la fréquence de grappes touchées varie de 2 à 40 % (moyenne 13 %).

La situation est identique sur les autres réseaux.


### 2. Analyse de risque

La réceptivité des grappes à de nouvelles contaminations est maintenant proche de zéro, mais la maladie peut continuer à progresser sur les baies déjà contaminées. Restez vigilant jusqu'au stade « fin fermeture de la grappe » (soit vers le 20 juillet), notamment dans les parcelles présentant des symptômes sur feuilles et grappes.

Vérifiez l'état sanitaire de vos parcelles (50 grappes, en faisant un aller-retour dans la parcelle).

Adaptez la fin de la protection à l'état sanitaire de la parcelle :

- Moins de 10 % de grappes touchées : arrêt de la protection ;
- Plus de 10 % de grappes touchées : prise en compte du risque oïdium jusqu'au stade « début véraison ».



### 3. Gestion alternative du risque

Les mesures prophylactiques (réduction de la vigueur, travaux en vert, palissage soigné pour aérer la zone des grappes, effeuillage précoce sur une face côté soleil levant) permettent de limiter la pression de l'oïdium.

Des fiches sur les méthodes alternatives et la prophylaxie sont disponibles [Vigne | DRAAF Grand Est](#)



Il existe des produits de biocontrôle, dont certains peuvent avoir une efficacité partielle.



LE GROUPE OIDIUM / VIGNE / AZA-NAPHTHALENES (AZN) EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.



En cas de suspicion de symptômes de jaunisse, faites un signalement sur l'application VigiCA ou par mail à l'adresse [fd@champagne.fr](mailto:fd@champagne.fr), et dans tous les cas, marquez le cep et l'entrée de route avec de la rubalise, et envoyez des photos.

Des prospections précoces se déroulent actuellement et jusqu'au 24 juillet, autour des foyers de 2025, afin de repérer au plus tôt les ceps symptomatiques. Il s'agit de prospections volontaires, qui ne remplacent pas les prospections obligatoires d'août-septembre.


Les périmètres des prospections obligatoires, que cela soit en Zones Délimitées (zones avec foyers de « flavescence dorée » identifiés) et hors Zones Délimitées, sont consultables sur l'extranet du Comité Champagne. Une photo en vue aérienne s'affiche par défaut, mais le parcellaire peut être sélectionné. Aussi, découvrez les zones qui vous concernent dès à présent !

[https://civcwebsig.agaricids.com/index.php/view/map?repository=prelevementsjaunissespublic&project=1\\_ab\\_prospections\\_obligatoires\\_2026](https://civcwebsig.agaricids.com/index.php/view/map?repository=prelevementsjaunissespublic&project=1_ab_prospections_obligatoires_2026)

La campagne de surveillance se déroulera du 19 août au 25 septembre avec une pause vendanges. Quelques dates sont d'ores et déjà fixées, la majorité le sera dernière quinzaine de juillet.

Pour toute information, consultez la page « flavescence dorée » de l'extranet du Comité Champagne :

<https://extranet.comitechampagne.fr/vigne/flavescence>



## Vos contacts

### Secrétariat - Informations FD

Service Vigne

[fd@champagne.fr](mailto:fd@champagne.fr)  
03 26 51 50 64

### Pascale Pienne

Service Ecosystème et Protection

[fd@champagne.fr](mailto:fd@champagne.fr)  
03 26 51 50 64

### Clément Gaunel

Service Ecosystème et Protection

[fd@champagne.fr](mailto:fd@champagne.fr)  
03 26 51 50 64

### Alexandra Bonomelli

Service Ecosystème et Protection

[fd@champagne.fr](mailto:fd@champagne.fr)  
03 26 51 50 64




### 1 Situation

Le vol des papillons se poursuit. Une perforation a été observée en secteur non confusé. Toutefois, les conditions météo sont à nouveau défavorables aux papillons, pour au moins une dizaine de jours.

### 2 Analyse du risque

En secteurs non confusés, le risque G2 est potentiellement présent.

En cas de question, rapprochez vous de votre technicien de proximité habituel.



*Œuf d'eudémis (irisé)*



*Œuf de cochylis (nacré)*

### 3. Gestion alternative du risque

Pour en savoir plus sur la confusion sexuelle :

<https://ecophytopic.fr/leviers/proteger/pratiquer-la-confusion-sexuelle>

Des fiches sur les méthodes alternatives et la prophylaxie sont disponibles :

[https://grandest.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user\\_upload/273\\_chambre\\_dagriculture\\_grand\\_est/S\\_adapter\\_aux\\_transitions/Ecophyto/Fiches\\_prophylaxie/Viticulture/Vers\\_de\\_la\\_grappe.pdf](https://grandest.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/273_chambre_dagriculture_grand_est/S_adapter_aux_transitions/Ecophyto/Fiches_prophylaxie/Viticulture/Vers_de_la_grappe.pdf)

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

**Observations :** Ceresia, Certico, Chambre d'Agriculture de la Marne, Champagne Chassenay d'Arce, Champagne Veuve Cliquot Ponsardin, Champagne Vranken Pommery, Comité Champagne, Compas, CSGV, Ets Ritard, GDV Aube, GDV Marne, GEDV Aisne, Novagrain, Stahl, Terroirs et Vignerons de Champagne, Union Aube Vignerons en Champagne, Union Champagne, Vinelyss, Viti-Concept.

**Rédaction et animation :** Comité Champagne.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est. Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

**Coordination et renseignements :** Joliane BRAILLARD - [joliane.brillard@grandest.chambagri.fr](mailto:joliane.brillard@grandest.chambagri.fr)



## NOTES NATIONALES BIODIVERSITÉ

Les notes Biodiversité sont produites dans le cadre du Bulletin Santé Végétal BSV 2.0. Elles sont publiées régulièrement et mettent en avant les pratiques agricoles concourant au maintien ou à l'amélioration de la biodiversité.

L'objectif de ces notes est de faciliter la communication sur ces sujets auprès des agriculteurs, des conseillers agricoles mais aussi plus largement à tout lecteur du BSV 2.0.

<https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/notes-nationales-biodiversite>

