



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

V i g n e

## CHAMPAGNE ARDENNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 549 du 11 mai 2006 - 2 pages

### Stades


Les températures assez élevées de la semaine dernière ont favorisé un développement soutenu de la végétation.

Stades moyens observés :

**Chardonnays**: 12 "5 feuilles étalées" (6ème feuille non étalée)

**Pinots noirs** : fin 09 "2 à 3 feuilles étalées" à majoritairement début 12.

**Pinots meuniers**: 09 "2 à 3 feuilles étalées"



Les chardonnays en moyenne :  
5 feuilles étalées

■ **Nos conseils** : pour les secteurs aubois concernés, lors du démarrage de la lutte anti-mildiou, choisir une spécialité également homologuée contre le brenner.

### Oïdium

Pour la très grande majorité des parcelles, la protection spécifique contre cette maladie, sera mise en oeuvre à partir du stade 17 "10 feuilles, boutons floraux séparés". Dans les quelques cas assez particuliers de parcelles concernées par des attaques en 2005, la protection pourra débuter au stade 15 "7 feuilles étalées, boutons floraux agglomérés".

■ **Nos conseils** : actuellement aucun traitement anti-oïdium n'est nécessaire.

### Mildiou

Les pluies annoncées du 5 au 8 mai ont effectivement touché l'ensemble du vignoble champenois. Localement, avec un caractère orageux, cas aux Riceys le 6 mai (jusqu'à 50 mm lors de cet épisode). Au total, le cumul des pluies sur cette période dépasse dans la plupart des postes 35 mm, et davantage pour l'Aube (60 à 100 mm cumulés). La journée du 9 mai, avec une pluie continue et régulière a contribué à détremper les sols.

Ces conditions ont permis d'obtenir la maturation des oeufs de mildiou. Les parcelles étaient toutes réceptives et les températures non limitantes. Les premières contaminations ont été enregistrées par le modèle Milvit sur l'ensemble des postes les 6, 7 et 8 mai. Compte tenu des prévisions météorologiques pour les prochains jours, les premières sorties de taches sont attendues à partir du 15-16 mai. Voir l'encadré pour le concours Mildiou.

■ **Nos conseils** : la première intervention doit être positionnée avant les premières sorties de taches, donc avant le 15 mai. Préférer à ce stade de végétation et compte tenu des prévisions météo, des anti-mildiou pénétrants, voire systémiques (Mémo 2006 p°5, p°7, p°10 et p°11).

### Brenner

De fortes projections ont été enregistrées au cours de la période 6-9 mai.

### Pyrales

Toutes les observations actuelles des différents réseaux convergent vers le même constat, la présence de chenilles est relativement fréquente dans les parcelles, par contre les niveaux d'infestation sont généralement bas. La période des remontées (colonisation des jeunes pousses) se termine progressivement. Actuellement, la taille moyenne des chenilles se situe vers 4 mm. Les parcelles les plus concernées dépassent rarement 50 % de ceps porteurs d'au moins une pyrale.

■ **Nos conseils** : le seuil d'intervention (80 % de pieds porteurs d'au moins une chenille de pyrale) n'est pas atteint. A priori aucun traitement spécifique n'est justifié actuellement.

### Tordeuses

Le vol des cochylys et, dans une mesure un peu moindre, en eudémis pour les secteurs concernés, s'est bien intensifié juste avant la période pluvieuse. Les tous premiers oeufs, essentiellement de cochylys, sont observés en différents secteurs (Côte des Blancs, Sézannais, Vallée de la Marne, Grande Montagne) dans les parcelles les plus précoces (inflorescences bien dégagées). A ce jour, il est encore trop tôt pour évaluer quantitativement l'activité de ponte.

■ **Nos conseils** : attendre nos prochaines observations, aucune intervention n'est à prévoir prochainement.

Le concours mildiou sera ouvert dès le début de la semaine prochaine.



**Mildiou**  
1ère intervention pour cette fin de semaine, avant le 15 mai

**Oïdium**  
trop tôt ne pas traiter, attendre

**Pyrale**  
aucune parcelle au seuil

**DRAF**  
Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
Centre de Recherches  
Agronomiques  
2 esplanade Roland  
Garros - BP 234  
51686 Reims Cedex 2  
Tel: 03.26.77.36.40  
Fax: 03.26.77.36.74  
E-mail: srpv.draf-  
champagne-ardenne@  
agriculture.gouv.fr

Imprimé à la station  
D'Avertissements  
Agricoles de  
Champagne Ardenne  
Directeur gérant :  
M. COLLOT  
Publication périodique  
C.P.P.A.P n°0905 B 05574  
ISSN n°0996-9861  
Tarifs : Courrier 79 euro  
Fax 75 euro Mail 74 euro  
Diffusion en collaboration  
avec la FREDONCA  
(Art. L252-1 à L252-5 du  
Code Rural)

## Acariens rouges

Dans les parcelles concernées, les éclosions d'oeufs de *p. ulmi* se terminent. La fréquence de parcelles concernées par des acariens rouges semble un peu plus significative cette année (par exemple : parcelles sur le terroir de Chouilly, Passy Grigny,...). Généralement la présence de typhlodromes permet de réguler ces acariens phytophages. Quelques cas très ponctuels avec marquages de jeunes feuilles sont visibles, ces parcelles sont à surveiller en priorité mais en général le développement de la végétation permet une dilution des populations.

■ **Nos conseils : maintenir la surveillance des populations d'acariens dans les parcelles sensibles. Lors de la mise en oeuvre des traitements phytosanitaires privilégier dans la mesure du possible, les produits les plus respectueux de la faune auxiliaire.**

## Concours Mildiou

La détection des premières taches de mildiou est susceptible de fournir des indications précieuses aux Organismes chargés de suivre l'évolution du champignon et de contribuer à l'élaboration des avis de traitement.

Organisé par le CIVC et le SRPV, le concours récompense les personnes trouvant les premières taches de mildiou. Pour chacune des 20 régions viticoles de la Champagne, le CIVC offre une analyse fertilisation Vitisol pour la découverte de la première tache. Le SRPV offre un abonnement aux Avertissements Agricoles pour la découverte de la deuxième tache dans une autre commune de la même région. Les concurrents devront informer sans délai le SRPV (03.26.77.36.40) de leur découverte et apporter ou expédier un échantillon (soit aux Services Techniques du CIVC à Epernay, soit au SRPV à Reims).

Pour envoyer la feuille porteuse de mildiou, placez-la sous buvard légèrement humidifié et en sachet plastique. L'échantillon devra être accompagné des renseignements suivants:

- nom, prénom, adresse et téléphone du concurrent;
- nom de la commune, date et heure de la découverte, nature du cépage, position de la tache sur le cep et importance du foyer de mildiou.

Bonne chance!