



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## CHAMPAGNE ARDENNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 591 du 16 avril 2008 - 2 pages

### Stades

La persistance depuis plus de trois semaines à présent de conditions très fraîches, pluvieuses et très peu ensoleillées ne favorise pas une dynamique de débourrement particulièrement rapide, contrairement notamment aux conditions de la même époque en 2007. A titre purement indicatif, les stades actuellement observés sont pratiquement équivalents à ceux observés en 2006 et 2005.

Une légère évolution est notée depuis ces derniers jours.

Stades moyens observés :

**Chardonnays** : stade 05 'pointe verte' acquis en secteurs hâtifs, ailleurs il se généralise progressivement.

**Pinots noirs** : 03 'bourgeon dans le coton, bourre bien visible', certains sont proches du stade 05.

**Meuniers** : stade 02 'début gonflement' en cours.



Stade 05 - pointe verte en Chardonnay

### Gel

Suite aux gelées du 8 avril évoquées dans notre précédent bulletin, certains dégâts encore peu quantifiables affectant des bourgeons, sont observés depuis peu (source Magister). Observations encore ponctuelles réalisées à Verzenay, Bethon et Villers aux Noeuds.

### Mange-bourgeons

Jusqu'à présent, la pression exercée par ces ravageurs demeure très limitée et ne concerne réellement que quelques parcelles. Actuellement, la plupart des symptômes de bourgeons attaqués présente des nécroses traduisant des attaques antérieures, non récentes. Les chenilles de boarmies s'observent de moins en moins à présent, celles de noctuelles, qui s'enterrent le jour, révèlent une fréquence peu élevée et surtout une

activité encore très limitée. Ainsi, de vastes secteurs sont très peu concernés cette année par ces ravageurs notamment la Côte des Bar, Montgueux, la Vallée de la Marne (rive droite et rive gauche). Dans d'autres secteurs habituellement plus sensibles, les cas de dépassement du seuil d'intervention s'avèrent très limités. En ce début de semaine, moins de 5 % des parcelles du réseau Magister atteignent ou dépassent ce seuil (seuil d'intervention à relativiser, voir bulletin n° 588 p°2 du 27 mars). Les nombreuses observations réalisées en d'autres réseaux partenaires reflètent la même situation. Les chardonnays atteignant le stade 'pointe verte' devraient assez rapidement quitter la phase de sensibilité, par contre les parcelles se situant encore en phase de gonflement demeurent sensibles.

■ **Nos conseils** : maintenir une surveillance des parcelles encore sensibles. Toujours effectuer des comptages précis par parcelle avant toute décision. Les traitements insecticides doivent rester très ponctuels voire exceptionnels en cas de dépassements avérés du seuil d'intervention et ciblés sur des dégâts récents. Autrement dit, ils doivent être justifiés.

### Tordeuses

Le réseau de piégeage, présenté au verso, est actuellement en place sur l'ensemble du vignoble. Assez logiquement, compte tenu des conditions climatiques et même de l'évolution actuelle des stades phénologiques de la vigne, aucune capture de cochylis ou d'eudémis n'est encore enregistrée. Un prochain réchauffement sera plus décisif.

### confusion sexuelle : pose des diffuseurs

Pour cette année, le total des surfaces protégées en Champagne par confusion sexuelle devrait atteindre 7000 ha. Comme précisé dans notre précédent bulletin, les chantiers de pose se déploient actuellement et jusqu'au 23 avril suivant la précocité des sites. Respecter au mieux les dates prévues.



**Mange-bourgeons**  
peu d'évolution, très faibles dégâts en général, fin progressive de sensibilité en parcelles précoces

**Réseau de piégeage des tordeuses** : mise en place des pièges cochylis et eudémis

DRAF  
Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
Centre de Recherches  
Agronomiques  
2 esplanade Roland  
Garros - BP 234  
51686 Reims Cedex 2  
Tel: 03.26.77.36.40  
Fax: 03.26.77.36.74  
E-mail: srpv.draf-  
champagne-ardenne@  
agriculture.gouv.fr

Imprimé à la station  
D'Avertissements  
Agricoles de  
Champagne Ardenne  
Directeur gérant :  
M. COLLOT  
Publication périodique  
C.P.P.A.P n°0905 B 05574  
ISSN n°0996-9861  
Tarifs : Courrier 90 euros  
Fax 77 euros  
Mail 74 euros  
Diffusion en collaboration  
avec la FREDONCA  
(Art. L252-1 à L252-5 du  
Code Rural)

# Réseau de piégeage officiel des tordeuses en 2008

## La cochyliis toujours largement majoritaire, et l'eudémis sous surveillance...

Le piégeage par phéromones sexuelles des cochyliis et eudémis (papillons mâles), permet de connaître les dates et les dynamiques de vol au cours des deux générations annuelles. La constitution d'un réseau de piégeage permet de cerner les régions et secteurs du vignoble les plus concernés. Ce traditionnel réseau comportant actuellement plus de 125 pièges répond à cet objectif. Depuis, 2006 ce réseau a été dupliqué pour mieux surveiller l'eudémis (financement CIVC). Ce dispositif repose sur la participation bénévole d'observateurs piègeurs animés par le SRPV utilisant des moyens de transmissions informatisés du Ministère de l'Agriculture. Ces données sont recueillies et interprétées au cours de la campagne. Le fonctionnement de ces pièges 'officiels' ne doit pas être perturbé par d'autres non reconnus. En cas de doute, prendre contact avec le SRPV. De même, l'emplacement des pièges et donc les communes concernées sont susceptibles d'évoluer en fonction des surfaces nouvellement menées sous confusion sexuelle.

